

# Planteværn efterår 2014

Hornsyld Købmandsgaard's standard løsninger efteråret 2014:

Vintersæd	Middel	Dosis/ha	Kommentar
Standartløsning mod tokimbladet ukrudt og Enårig Rapgræs	Boxer+ DFF + Oxitril	0,75-1,5 ltr. +0,05-0,075 ltr. +0,15 ltr.	Udbringes så snart sprøjtespor kan ses. Dvs. ca. 7-10 dage efter såning (st. 10-11) <b>Max 0,05 DFF i vinterbyg og rug.</b>
Ved forekomst af rajgræs	Boxer + DFF + Oxitril	1,5-2,0 ltr. + 0,05-0,075ltr. + 0,15 ltr.	Udbringes så snart sprøjtespor kan ses. Dvs. ca. 7- 10 dage efter såning (st. 10-11) Opfølgning forår med Hussar/Broadway/Cossack. <b>Max 0,05 DFF i vinterbyg og rug.</b>
Tokimbladet ukrudt og Enårig rapgræs og Vindaks	Boxer + Stomp SC	0,75 – 1,0 ltr . + 0,6 – 1,0 ltr.	Udbringes så snart sprøjtespor kan ses. Dvs. 7-14 dage efter såning (st. 10-11).
Ved forekomst af Agerrævehale og Væselhale	Boxer+ Lexus	1,5 ltr. + 7 gr.	Opfølgning forår med Foxtrot, Atlantis OD eller Cossack OD.
Ved forekomst af Agerrævehale og Væselhale ( <b>2 delt løsning v/ tidlig såning</b> )	Boxer + DFF  Atlantis OD	1,5-2,0 ltr. + 0,05 ltr.  0,7 ltr	St. 10-11  St. 13-14
Enårig rapgræs, vindaks, rajgræs og bredbladet ukrudt	Boxer+Atlantis OD + DFF	0,75 ltr. + 0,4- 0,6 ltr.+ 0,05 ltr.	Højeste dosering ved forekomst af rajgræs – <b>Atlantis OD må ikke bruges i vinterbyg.</b> Tidligst st. 13

Vinterraps	Middel	Dosis/ha	Kommentar
Bredbladet ukrudt	Reactor SC/Command SC	0,2 - 0,25 ltr.	Senest 2-3 dage efter såning. max 0,2 ltr./ha. på sandjord.
Bredbladet ukrudt +valmue	Reactor SC/Command SC + Stomp	0,15 ltr.+0,5 ltr	Senest 2-3 dage efter såning.
Spildkorn + græsser	Agil + spredklæbemiddel	0,25 - 0,5 ltr. + 0,2 ltr.	Spildkorn 1-2 blade.
Spildkorn + græsser	Focus Ultra + Dash	0,4-0,7 ltr. + 0,5 ltr.	Spildkorn 1-2 blade. Bedste effekt overfor rajgræsser.
Rapsjordlopper	Karate 2,5 WG eller Kaiso Sorbie 5 WG	75-150 gr. 40-75 gr.	Max. 3 beh. pr. vækstsæson. Max. 1 beh. pr. vækstsæson.
Agersnegle	Sluxx HP	1-5 kg.	Forebyggende = 1-2 kg. Ved angreb = 5 kg.
Vækstregulering	Caryx	0,7 ltr.	St. 13-20
Rodhalsråd (phoma)	Orius 200 EW	0,5-0,7 ltr.	St. 14-18, kan have en hvis vækstregulerende effekt.
Spildkorn	Kerb 400 SC	0,6 – 1,25 ltr.	Jordtemperatur under 7 grader. <b>Husk udfyldelse af dispensation.</b>